

6 リュウキュウベニイトトンボ

沖縄民謡のセンスル節に登場するよ

方 センスルー、サンシンダーマーなど

- 方言名のセンスルーはイトトンボの仲間全体のこと。
- オスは水辺の植物にとまり、なわばりをもつ。
- 水辺の近くにいることが多いが、街なかでも見つかる。



8 ハイイロテントウ

北アメリカ原産の外来種

- 1987年に恩納村で見つかり、今では県内ほぼ全域で見られる。



大きき 2mm (size 2mm)



大きき 5m (size 5m)

葉 暗くなると葉を閉じる (leaves close when dark), 実 サヤエンドウのような実 (fruit like a pea pod)

ギンネムキジラミ (Ginnemu-kijirami), ギンネムの汁 (Ginnemu juice), 幼虫も成虫もギンネムの汁を吸い、若い葉っぱや茎に卵を産む。ギンネムを枯らすこともある。 (larvae and adults suck Ginnemu juice, lay eggs on young leaves and stems, can kill Ginnemu), ギンネムの毒成分ミモシンを分解することができる。 (can decompose mimosin, a toxic component of Ginnemu).

●葉や茎にミモシンという毒成分があり、動物が食べると毛が抜けるといわれる。他の植物を育ちにくくする作用もある。 (leaves and stems contain mimosin, a toxic component, animals that eat it lose their fur, it also has an allelopathic effect on other plants), 沖縄には、1910年に荒地の緑化や薪の素材など様々な利用を目的に持ち込まれた。 (Okinawa has used it since 1910 for greening wastelands, firewood, etc.), 大きき 30~150cm (size 30-150cm), すみか 林のまわり、日当たりのよい草地や畑、道端など (habitat: around forests, sunny grasslands, fields, roadsides).

カズザキヨモギ (Kazuzaki-yomogi), 花 (flower), 葉 (leaf), 実 (fruit), 大きき 30~150cm (size 30-150cm), すみか 林のまわり、日当たりのよい草地や畑、道端など (habitat: around forests, sunny grasslands, fields, roadsides).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).


5 イソヒヨドリ

高い場所でさえずるよ

方 イシサー、イシサー、イシサー、カーラバンサーなど

昆虫、甲殻類、トカゲなど

- 雄雌ともにさえずる。海岸の岩場をすみかにしていたが、コンクリートの建物が増えて生活できる場所が増えた。



オス (male), メス (female), 大きき 23cm (size 23cm), 全体がこげ茶色 (whole body brown), 胸は白いウロコもよう (chest like white scales), すみか 海岸の岩場、街中の建物、木の上、地面など (habitat: rocky shore, buildings, trees, ground).

7 ニシヨモギ

沖縄ではヤギ汁やジュシー、お餅などに使われているよ

方 フーチハー

- 別名オキナワヨモギ
- 花 大きき 3mm (size 3mm)
- 葉 花のまわりの葉は細長い (leaves around flowers are long)
- 実 大きき 0.5~3mm (size 0.5-3mm)



大きき 30~150cm (size 30-150cm), すみか 林のまわり、日当たりのよい草地や畑、道端など (habitat: around forests, sunny grasslands, fields, roadsides).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).


2 キノボリトカゲ

しっぽは緑と茶のしましま

方 グリーンパンパン、キノボリサンデー、アタク、キータンジョーなど

昆虫やクモなど

- けんかの時に、うで立てふせをする。
- まわりに合わせて体の色をかえる。



オス (male), メス (female), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 背中が黒い (back black), オキナワキノボリトカゲ (Okinawa Kinoboritorokage), すみか 公園やウタキの木に多い。地面にすることも多い。 (habitat: many in parks and Uta-ki trees, also on ground).

4 ツルムラサキ

島野菜として主に緑色のものが栽培されている

方 ジーピン

- 熱帯地域では野菜として植えられている。日本へは江戸時代と明治時代に渡ってきた。
- 総合対策外来種(緊急対策外来種や重点対策外来種の下位) / 環境省



大きき 0.5~3mm (size 0.5-3mm), すみか 林や家のまわり、日当たりのよい畑など湿度の高い場所を好む。 (habitat: around forests and homes, sunny fields, high humidity).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

1 アオカナヘビ類

細長い体で、しっぽがながいよ

方 ジューミー、チャール、アングチュー、マースケーなど

昆虫やクモなど

- しっぽは長く、おさえると根元から切れる。切れたしっぽはしばらく動くので、それに天敵が気を取られている間に、にげる。



オス (male), メス (female), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 背中が黒い (back black), オキナワキノボリトカゲ (Okinawa Kinoboritorokage), すみか 公園やウタキの木に多い。地面にすることも多い。 (habitat: many in parks and Uta-ki trees, also on ground).

3 グリーンアノール

日本の侵略的外来種ワースト100

方 ジーピン

- 熱帯地域では野菜として植えられている。日本へは江戸時代と明治時代に渡ってきた。
- 総合対策外来種(緊急対策外来種や重点対策外来種の下位) / 環境省



大きき 0.5~3mm (size 0.5-3mm), すみか 林や家のまわり、日当たりのよい畑など湿度の高い場所を好む。 (habitat: around forests and homes, sunny fields, high humidity).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

アオカナヘビ類 (Aokanahibi-rui), キノボリトカゲ (Kinoboritorokage), グリーンアノール (Green Anole), 大きき 25cm (size 25cm), 大きき 16~25cm (size 16-25cm), 大きき 12~20cm (size 12-20cm).

生きものいっせいで調査 2024 ジューミーさがし

2024年7月20日(土)~8月31日(土)

昔はよく見たアオカナヘビが、最近みつからないんだ。キミのまわりではどう？特徴を見ながら探してみよう！

レッドデータブック (RDB) の説明

絶滅危惧種 (絶滅危惧種、準絶滅危惧種) については「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 (レッドデータおきなわ) 第3版」より

絶滅危惧種 (絶滅危惧種、準絶滅危惧種) については「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 (レッドデータおきなわ) 第3版」より

検索 ジューミーさがし

https://www.okinawa-ikimono.com

主催: 沖縄県 後援: 沖縄県教育委員会

マークの説明

固有種 (固有種)

外来種 (外来種)

方言 (方言)

食べもの (食べもの)

すみか (すみか)

生きている (生きている)

生きている (生きている)

生きものいっせいで調査 2024 ジューミーさがし

2024年7月20日(土)~8月31日(土)

昔はよく見たアオカナヘビが、最近みつからないんだ。キミのまわりではどう？特徴を見ながら探してみよう！

アオカナヘビ類 大きき 25cm (size 25cm)

キノボリトカゲ 大きき 16~25cm (size 16-25cm)

グリーンアノール 大きき 12~20cm (size 12-20cm)

トカゲ3種の大きき単位: cm

生きものいっせいで調査 2024 ジューミーさがし

2024年7月20日(土)~8月31日(土)

昔はよく見たアオカナヘビが、最近みつからないんだ。キミのまわりではどう？特徴を見ながら探してみよう！

生きものさがシート

学校名:

小学校

年

組

名前

アオカナヘビ類 <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所	キノボリトカゲ <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所	グリーンアノール <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所	ツルムラサキ <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所
イソヒヨドリ <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所	リュウキュウベニイトトンボ <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所	ニシヨモギ <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所	ハイロテントウ <input type="checkbox"/> 見つけた <input type="checkbox"/> 見なかった ちいきでのよび名 見つけた場所
感じたこと 気づいたこと			



シートのかきかた

みんなの調査は、ホームページにまとめられて、生きものの地図ができるよ！(春頃を予定)

ちいきによって、いる生きものがちがうよ。みんなの校区には何がいるかな？

「生きものさがシート」の注意とコツ、生きもの、ふくそうを読んでおく

期間中に、**校区内**で8種類の生きものをさがす
 「生きものさがシート」表面を見てね

「生きものさがシート」に記入！
 どちらかにチェックをつけてね
見つけた 見なかった

よび名の
 おうちの人やまわりの大人に聞いてみよう

場所
 だいたいの場所を書く
 ○○小学校のうら山
 □□公園、△△町の家の庭

先生にていしゅつ

先生にていしゅつする時にキリトリ

校区内でさがそう!

車で出かけたおきの場所ではなく、自分の家や学校の近くでさがしてね。

大人にきく この生きものがどこにいるか、よび名は何かまいてみよう。むかしとくらべて、ふえたりへったりしているかな？

ちゅういすること
 このページを読んでおく

ケガに注意!
 ねっちゅうのように気をつける。

生きものは持ち帰るのはやめよう！
 そっと観察。

しゃしんだけネ

山や森にはひとりで行かない。

よその庭や畑、あぶない場所に入らない。

生きものさがしのふくそう

ぼうし
 山や森の中ではなるべく長スボン
 長そで

運動くつ

持ち物
 すいとろ
 えんぴつ

ハブ

気をつけよう
 この生きものに
 おっ

かまれたら1〜9番で救急車を！

体はくさりもようであたまがサンカク

いしがき石垣の穴、はたけ畑、草むら、えだの上などにいる。ネズミやカエルがこぶつ。

写真提供: 沖縄県衛生環境研究所

ハチ

オキナワチビアシナガバチ

アシナガバチ

ハチを手ではらったりすに近づいたりしない。黒いところ(頭、黒い服)がさされやすい。もしハチがこげきしてきたら、ネズミやカエルがはなれる。すぐにそのばをはなれる。

写真提供: オキナワチビアシナガバチ提供: 石神弘

ムカデ

夜行せいで、昼間はたおれた木やおち葉の下などにいる。どくがあり、かまれるととてもいたい。

毛虫

(タイワンキドクガなど)

毛にどくがある。木や葉っぱのそばで生きものをさがす時は気をつける。

写真提供: 沖縄県衛生環境研究所

